

أضرار التدخين



التدخين يُقربُك من الموت



وزارة الصحة
خدمات الصحة العامة
قسم التنقيف الصحي

التدخن يُقرِّبُ من الموت

٤) من الخلل في العلاقات الجنسية وحتى الاصابة بالسرطان

- خلل في العلاقات الجنسية - دلت الابحاث الكثيرة التي نشرت في الاونة الاخيرة على أن التدخين يصيب الحيوانات المنوية. وبالإضافة لذلك، وجد على أن العنة (عدم انتصاب العضو الذكري) منتشرة بشكل أكثر لدى المدخنين بالمقارنة مع الاشخاص غير المدخنين.
 - يسبب التدخين جلد الوجه: يساعد على ظهور التجاعيد. يؤدي لجلد رقيق وفاضي اللون والى لون أصفر - محمر ويؤدي الى هرم الجلد في وقت مبكر.
 - يسبب التدخين الحساسية في العينين والمصداع لدى الكثير من الكبار ، كما يسبب التهيج في مخاطية الانف والسعال. وكذلك يؤدي لظهور اعراض تحسسية في مجاري التنفس والعينين.
 - التدخين يضر باللثة وبالاسنان.
 - التدخين يضعف اللياقة البدنية بشكل فوري.
 - التدخين يسبب الامراض الصعبية في المجاري التنفسية: كالتهاب القصبيات الرئوية، الربو وانتفاخ الحويصلات الرئوية.
 - التدخين يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ... النيكوتين يجهد القلب، الامر الذي يزيد من التبض وضغط الدم، مسبباً التشنجات في كافة اوعية الجسم الدموية.
 - تدخين السجائر هو المسبب الرئيسي لحدوث سرطان الرئتين وانواع اخرى من السرطان: كسرطان البليوم، الحلق والمريء، سرطان المعدة، الباينكرياس، الكلية والمثانة.

لتدخن أثناء الحمل - يصيب الجنين

- التدخين أثناء الحمل يصيب صحة المرأة وكذلك صحة الجنين على حد سواء، كما أن وزن الطفل المولود يكون أصغر مما هو متوقع. تزداد نسبة الاجهاض والولادة المبكرة لأجنة ميتة لنساء مدخنات أثناء الحمل، وكذلك تزداد نسبة الوفيات، المتعلقة بالولادة لدى مواليد تلك النساء المدخنات بالمقارنة مع نساء غير مدخنات.

للتدخين بصورة سلبية - خطورة فعلية

- الشخص الذي يقف أمام شخص مدخن يعتبر مدخناً (خاصة في الأماكن المغلقة) لأنّه يصبح مدخناً رغمًا عنه (تدخين قسري)، هذا الشخص يستنشق لرئتيه قسماً كبيراً من الملواد السامة الموجودة في دخان السيجارة، ويمكن الكشف عن ذلك بواسطة الفحوص المخبرية للدم والبول والألعاب.
 - نسبة سلطان الرئتين والنوبات القلبية أعلى لدى المعرضين للتدخين القسري.
 - تأثير التدخين القسري على الأطفال الذين يعيشون في بيت مدخنين أمر يتبعغى أن يقلل الوالدين: أمراض الرئتين كالتهاب القصبات الرئوية التي تنتشر أكثر لدى أطفال المدخنين. تزداد نسبة احتمال احتياج طفل لمدخلة للعلاج في المستشفى بسبب اضطرابات رئوية، بنسبة ٧٠٪ بالمقارنة مع طفل لام غير مدخنة. لدى أطفال الآباء المدخنين تزداد حالات التهاب السحايا الدماغية بالمقارنة مع اطفال لا يعيشون غير مدخنين.
 - يظهر أن هناك تأثيراً سليماً في المدى البعيد، على النطورة النفسية والعقلية عند أطفال الآباء اللذان يفرون في التدخين بالقرب من اطفالهم.