

Центр по проверке ВИЧ	Поликлиника и ее местонахождение	Дни и время работы	Телефон
Больница "Рамбам", Хайфа	Поликлиника, первый этаж	Воскр., 08:00-10:00 Втор., 12:30-14:45	04-8543452
Больница "Каплан", Реховот	"Клиника СПИД", Наве-Ор	Воскр., 12:00-15:00 Четв., 12:00-15:00	08-9441314 08-9441892
Больница "Ихилов", Тель-Авив	Регистратура поликлинического центра	Понед., 08:00-09:45 Втор., 15:00-16:45	03-6973653
Больница "Шибба", Тель-Хашомер	Поликлиника, второй этаж, рядом с Институтом реабилитации больных с заболеванием сердца	Воскр., 09:00-13:00 Сред., 16:00-18:00 Четв., 10:00-11:30	03-5304937
Больница "Адаса", Иерусалим	Дом здоровья "Адаса", ул. Штраус 24, второй этаж	Понед., 13:00-17:00 Сред., 13:00-17:00	02-6231921
Больница "Сорока", Беер-Шева	Здание центральной поликлиники	Понед., 12:30-14:30	08-6400465
Больница "Хаэмак", Афула	Поликлиника, третий этаж, отдел кожных заболеваний	Воскр., 08:00-14:00 Четв., 08:00-14:00	04-6495447 04-6494053
Больница "Мейер", Кфар-Саба	Поликлиника, подвальный этаж, отдел инфекционных заболеваний	Воскр., 08:30-10:00	09-7472896
Больница "Бейлинсон", Петах-Тиква	Поликлиника, первый этаж, ком. 161	Понед., Сред., 07:00-09:00 Понед., Втор., 11:00-14:00	03-9372259 03-9376920

Проверки проводятся также в государственных поликлиниках, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний, передающихся половым путём: **Тель-Авив**, ул. Левинский, 108 (на территории новой центральной автобусной станции, 5 этаж, помещение 5721, тел. 03-5373738) **Хайфа**, ул. Хапарсим, 15, тел. 04-8619719

Адрес электронной почты: [www.health.gov.il/stdisrael](mailto:www.health.gov.il/stdisrael)

**Открытая телефонная линия Комиссии по борьбе со СПИДом (при поддержке Минздрава Израиля) – 03-5108787**

**Организации занимающиеся разъяснением вопросов профилактики СПИДа и поддержкой лиц, инфицированных ВИЧ:**

Арабский Центр по борьбе со СПИДом – Кфар Мизраа, почтовый индекс 25230, тел. 04-9828354

Комиссия по борьбе со СПИДом (для повышения осведомлённости и помощи лицам, «живущим с ВИЧ», а также для ведения разъяснительной работы среди гомосексуалистов и лесбиянок)

**Тель-Авив**, ул. Геула, 10Н, третий этаж, тел. 03-5100520;

**Хайфа**, ул. Нордау, 6, третий этаж, тел. 04-855 2462;

**Беер-Шева**, ул. Мишьюль Бейтар, 1 кв. 3, тел. 08-9103102;


**Иерусалим**, ул. Ибен Шпрот, 17, тел. 02-5632227

**Проект «AIDS - Иерушалаим»** - координация пропаганды профилактики СПИДа среди подростков – почтовый ящик 7956, Иерусалим, тел. 02-6797677


**Израильский Центр по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди репатриантов, выходцев из Эфиопии**

**Ашдод**, почтовый ящик 2655, тел. 03-8520652

**Реховот**, ул. Левин Эпштейн, 14/11, тел. 08-9474084



**СПИД: знать больше, чтобы быть осторожнее и не заразиться**



Министерство здравоохранения  
Отдел профилактики  
туберкулёза и СПИДа

[www.health.gov.il/tbaid](http://www.health.gov.il/tbaid)

[www.health.gov.il/tbaid](http://www.health.gov.il/tbaid)



# Вирус, вызывающий СПИД существует и в Израиле!!

синдром приобретённого иммунодефицита

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - возбудитель заболевания, которое называется СПИД или ВИЧ-инфекция. Он разрушает иммунную систему человека, в результате чего организм теряет способность сопротивляться различным инфекциям.

## Излечения от СПИДа нет!

До сих пор не открыта вакцина и не создано специальное лекарство, способное излечить это заболевание.

## Что такое «коктейль»?

Коктейль - это комбинация нескольких лекарств, задерживающих развитие заболевания, но не излечивающих его.

## Как заражаются СПИДом?

Вирус иммунодефицита человека проникает в организм здорового человека во время «незащищённого» (то есть, без использования презерватива) полового акта (вагинально- го, анального, орального), так как вирус находится в наибольшей концентрации в сперме и вагинальной жидкости женщины.

ВИЧ-инфекция может передаваться через кровь, так как вирус находится в крови. Он может проникать в организм здорового человека при совместном и повторном использовании иглы, шприца, ножа, лезвия бритвы и татуировочных инструментов.

СПИД может передаваться от зараженной женщины, к плоду (во время беременности и родов) и к грудному ребёнку - через молоко в процессе вскармливания.

## Как не заражаются СПИДом?

СПИД не передаётся при рукопожатии и обнимании, потому что ВИЧ не способен жить в воздухе и на коже.

СПИД не передаётся при поцелуе, так как в слюне ВИЧ находится в мизерном количестве.

СПИД не передаётся при пользовании общей посудой, поскольку вирус не способен жить в воздухе и не передаётся со слюной.

СПИД не передаётся при пользовании общим унитазом, так как вирус нежизнеспособен в воздушной среде.

СПИД не передаётся через укусы насекомых, так как комар не способен переносить вирус СПИДа.

СПИД не передаётся при «защищённом» половом контакте, то есть тогда, когда партнёры пользуются презервативом, так как презерватив предупреждает контакт с выделениями из половых органов (сперма, влагалищная жидкость).

СПИД. Достаточно один раз без...



## Делаем «это» только с презервативом!

При вступлении в половой контакт, следует относиться к каждому новому половому партнёру, как к потенциальному носителю СПИДа. По внешнему виду нельзя разгадать в человеке носителя вируса. Единственный способ, подтверждающий, что у Вашего сексуального партнёра нет ВИЧ, - проверка на носительство вируса.

**Следует использовать презерватив при каждом половом контакте: вагинальном, анальном и оральном!**

## Правильное использование презерватива

Правильное использование презерватива повышает эффективность профилактики СПИДа и других болезней, передаваемых половым путём, а также предупреждает нежелательную беременность.

**Сексуальным партнёрам желательно использовать презерватив как неотъемлемую часть интимных отношений!**

## Практические советы для пользователей презервативом

необходимо проверить на упаковке срок годности презерватива; необходимо хранить презерватив в прохладном, сухом и защищённом месте;

**необходимо правильно пользоваться презервативом:** одевать его на половой член, находящийся в состоянии возбуждения (эрекции) до полового контакта, разворачивая его по всей поверхности до границы волосистой части у основания члена; удалить воздух, собравшийся в кончике презерватива путём мягкого надавливания, и смазать презерватив специальной водной эмульсией, если до этого он не был покрыт ею;

извлечь осторожно половой член из влагалища в конце полового акта ещё тогда, когда ещё сохранена эрекция не спала, чтобы предупредить возможное соскальзывания презерватива; для смазки презерватива нельзя использовать кремы на жирной основе, например, вазелин или увлажняющий крем, которые могут вызвать его разрыв.

## Говорите об этом!

Говорите о половом контакте, о СПИДе и о болезнях, передаваемых половым путём с Вашим половым партнёром.

## Настаивайте на использовании презерватива!

Использование презерватива предупреждает возможность заражения многими заболеваниями, передающимися половым путём, в том числе гонореей, сифилисом, хламидиозом, сывороточным гепатитом, герпесом и др.

## Опасно вступать в половой контакт на фоне употребления алкоголя или наркотиков!

Исследования показывают, что люди, употребляющие алкоголь или наркотики, реже других используют презерватив при половой близости.

## Опасно совместное или повторное использование игл, шприцов, лезвий и инструментов для татуировок!

**Когда можно прекратить использование презерватива?**

Если Вы находитесь со своим половым партнёром в «моногамных» отношениях (половые контакты только друг с другом) в течение, как минимум, трёх месяцев и получили отрицательный результат проверки на носительство ВИЧ, вам можно прекратить использование презерватива.

## Важно знать:

Проверка на носительство ВИЧ может дать достоверный ответ только по истечению трёх месяцев после заражения.

## Где можно пройти проверку на СПИД?

Дискретную проверку на СПИД можно пройти в каждой крупной больнице Израиля, где существуют «клиники СПИД» (подробная информация дана на последней странице буклета) или в общественных поликлиниках. В процессе проверки от Вас потребуются некоторые персональные сведения, которые будут охраняться Законом о неразглашении медицинской тайны. Проверки, проводимые в «клиниках СПИД», - бесплатны и включают в себя консультации специалистов.